

Quaestio Medica  
Cardinalitij Disputacib' agitata In Scholis Medicorū die Jov. 2. maij  
D. Jacobo marant Illustriſſ. Caroli à Lotharingia S. R. E. Cardinalis et sacros.  
Imperij Principis consiliario, et Medico Moderatoris sapientiff.

230

Etne Strumarum quam Bubonum Venereorum difficilior Curatio?

Affectionum extenuarum (Oxyuros vocant) tumores legat, partim à materia, vel phlegmoni, angustiae, ad una, leghyone, partim à loco i quo contingunt, et bubo, parotia, diuinitatib' detrimere, difficultate curandi à stomachi supertu. Sunt haec vel glandulae putri pituita, imbutae, et induratae, vel adarosi tumores propria tunica obvoluti, quasi in glandularum formam concreuerint, Idcirco non modo curantur, alia, et iugina, ubi glandulae multae calice sustinentur, immadunt. Sed etiam aliquando in mammae et testibus contingunt, ac reliquis partibus diffunduntur, prout videri intus conestunt, facunda. His naxopelas obole foras propagatur.

Tumorum omnium qui superius occurrunt, quos grauius tunc, et forte alijs grauiſſima symptomata inducunt, partim à laborantibus distanti-  
-bus, doloris, caloris, supra tumorem, auctum, comitum, putredinis, ruboris, pulsationis, duritiam, phlegmoni exquiritur quidam, aliter glandulae  
-lia sanguinis sola quantitate peccantibus obolae, aliter prothae, quae ab eodem tam corrupto aut coactis humoribus premixto ducunt originem, comit-  
-nate curatio formulae admittit resolutionem, et suppuracionem.

Intemperies qualis à sanguine si in adunum loca, maxime in iuginae amplexu bubo nominatur, à contusione, vel vlcere partem vicinam, unde  
fluxio excitatur, et glandulae intuscipitur, matuit, vel à natura quatuor morbosam ad amonitionem propellitur, ortum, Idcirco quibus coactis phlegmonae  
tundis curatur: nisi curata qualitat' ex vlcere contraeta infectus dignetur, in quo tunc repellitur abstinendum, sed eorum adeo topica, et qual partem  
vaxant, et quae foras attuasendo naturae propelluntur quotum adimant, quae tunc habet suppurandi, magis de artu ad hunc affectum perueniendum ad-  
bituo.

Sed et ex affectibus, calidior frigidior diuinitatibus, ita ex tumore qui à sanguine ducunt originem, stoma à pituitoso humore nate, angu-  
difficilior curatio, assequitur: Nam plerumque in schivum induratur, aut in elevatum cancerum degrediantur, dum eorum materia crassa et frigida  
sensim et calidior putredine acrimoniam acquirit, aut ab obolae premixta, quod modo excludendum, tunc etiam dolore, infir-  
-matione, et sensum gliscanti contagio, magis de magis sanantur tunc carcinomatice ~~curantur~~ curantur.

Strumarum aliae quidam, sublimae, exiguae, simplices, in eadem consistunt, et recedunt, nate, pubes prope raro contingunt, curatio, recipiunt  
communibus praedictis, sumptis et adnotis, tuncque non mediocriter tumant docta attendantia sudorifica, et translatum ex hac materia iugulatur, et situr et hanc  
quo: aliae ~~et~~ malignae, iugulatur, obolae, fibrosae, immutabiles, elevatae, profundae, neque vel plurimum sectionem ~~ferunt~~ fibunt, tuncque suppurant, neque  
solum medicamentis tractantur, sed etiam ipso contactu, ex quibus non modo difficultatis curatio, quam buboni vlcere colliguntur, sed etiam ad  
ducitur, et absoluta earum curatio citra miraculum vix est homini tribu copiatum.

Ergo est ~~difficilior~~ strumarum Bubonum Venereorum difficilior Curatio.

Proponebat Jacobus Cusinat Parisinus anno MDXII.